

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

neo-angin[®]

SPRAY

(14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml, roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek *neo-angin[®] spray* ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek *neo-angin[®] spray* i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku *neo-angin[®] spray*
3. Jak stosować lek *neo-angin[®] spray*
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek *neo-angin[®] spray*
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEO-ANGIN[®] SPRAY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

neo-angin[®] spray to lek w postaci roztworu do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Zawiera dwie substancje (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol) o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz lewomentol, który wywiera na błonach śluzowych uczucie chłodu i ma słabe działanie znieczulające miejscowo.

neo-angin[®] spray jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEO-ANGIN[®] SPRAY

Kiedy nie stosować leku *neo-angin[®] spray*

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol, lewomentol lub którykolwiek z pozostałych składników leku *neo-angin[®] spray*.
- jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inne schorzenia dróg oddechowych, w przebiegu których dochodzi do stanów spastycznych, gdyż podanie leku może spowodować skurcz oskrzeli.
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek *neo-angin[®] spray*

- jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono występowania istotnych interakcji z innymi lekami stosowanymi doustnie.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży.

Ze względu na zawartość etanolu leku *neo-angin[®] spray* nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku *neo-angin[®] spray*

Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

3. JAK STOSOWAĆ LEK *NEO-ANGIN*[®] *SPRAY*

Lek stosuje się na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Należy stosować jedną dawkę leku do 6 razy na dobę.

W celu podania dawki leku należy zdjąć nasadkę ochronną, wstrzymać oddech i nacisnąć dwukrotnie głowicę pojemnika, wprowadzając roztwór do jamy ustnej.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie należy przyjmować leku dłużej niż 3–4 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku *neo-angin*[®] *spray* jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku *neo-angin*[®] *spray*

Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku *neo-angin*[®] *spray*

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek *neo-angin*[®] *spray* może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) obserwowano podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego.

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK *NEO-ANGIN*[®] *SPRAY*

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku *neo-angin*[®] *spray* po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek *neo-angin*[®] *spray*

- Substancjami czynnymi leku są alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jeden ml roztworu zawiera 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 2,92 mg amylometakrezolu i 0,87 mg lewomentolu.
- Ponadto lek zawiera olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, etanol 96%, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek *neo-angin*[®] *spray* i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła oranżowego z rozpylaczem w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 15 lub 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Divapharma GmbH

Motzener Str.41

D-12277 Berlin

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 2011-12-27