

Instrukcja stosowania
Należy uważnie przeczytać.

junior-angin

Tabletki na gardło

dla dzieci o smaku truskawkowym

Chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła.

1. Czym są tabletki na gardło junior-angin i kiedy się je stosuje?

Tabletki na gardło junior-angin to wyrób medyczny przeznaczony do ochrony błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie w przypadku bólu gardła.

Podczas ssania porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła ochronny roślinny film. Proces ssania zapewnia równomierne rozprowadzenie substancji czynnych na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła.

Pozostałe składniki – cynk i pantotenian – służą jako kompleks pielęgnująco-ochronny dla błony śluzowej.

2. Jaki jest skład tabletek na gardło junior-angin?

Jedna tabletki na gardło junior-angin zawiera:
porost islandzki- suchy ekstrakt, pantotenian wapnia, glukonian cynku, sacharozę, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

3. Jak stosuje się tabletki na gardło junior-angin i jaka jest wielkość opakowań?

Tabletki na gardło junior-angin to tabletki do ssania.

Wielkość opakowania: 24 lub 36 tabletek do ssania.

Tabletki na gardło junior-angin należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2-3 godziny jedna tabletki na gardło junior-angin do ssania, maksymalnie do 3 tabletek dziennie. Może być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać tabletkę.

Jeśli ból gardła utrzymuje się dłużej niż 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem!





4. Kiedy nie wolno stosować tabletek na gardło junior-angin?

Tabletek na gardło junior-angin nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

5. Kiedy zalecana jest ostrożność przy stosowaniu tabletek na gardło junior-angin?

Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie ma potrzeby zachowywania jakichś szczególnych środków ostrożności. Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o ewentualnych chorobach, uczuleniach albo o zażywaniu leków (również tych kupowanych bez recepty).

6. Jaki jest okres ważności tabletek na gardło junior-angin?



Data ważności tabletek na gardło junior-angin jest wydrukowana na opakowaniu. Tabletek na gardło junior-angin nie należy stosować po upływie terminu ważności.

7. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Tabletki na gardło junior-angin należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data opracowania instrukcji: czerwiec 2014

Wyrób medyczny przeznaczony do sprzedaży wyłącznie w aptekach



Wytwórca:
MPC INTERNATIONAL S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG
Luxembourg

Dystrybutor na terenie Unii:
M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, D-50670 Köln, Niemcy

